

FLEXADRIN CREAM™

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS:

Scheduled 0

PROPRIETY NAME AND DOSAGE FORM:

Flexadrin Cream™

Read this leaflet carefully because it contains important information for you

Flexadrin Cream™ is available without a doctor's prescription.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share Flexadrin Cream™ with any other person
- Ask your doctor, pharmacist or healthcare provider if you need more information or advice

1. FLEXADRIN CREAM™ INGREDIENTS PER 100g:

Aqua(Water), Glycerine, Carbomer, Stearic Acid, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Cetareth 20, Dimethicone, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Methyl Salicylate 15%, Menthol 3%, Triethalonaminex

2. WHAT FLEXADRIN CREAM™ IS USED FOR:

Flexadrin Cream™ is indicated as a fast acting pain relief Cream that may help alleviate pains and improve the mobility of soft tissue injuries and joint flexibility. It may help the body to prevent long term wear and tear on muscles and joints.

3. BEFORE YOU TAKE/USE/GIVE FLEXADRIN CREAM™:

Do not use Flexadrin Cream™:

- If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the ingredients. (see; COMPOSITION)

Always tell your health care provider if you are taking any other medicine. If you are pregnant or breastfeeding your baby please consult your health care provider for advice before taking this medicine.

Pregnancy and breastfeeding:

Flexadrin Cream™ is not recommended for pregnant and lactating mothers to use/apply. Safety and efficacy on these conditions has not been investigated.

Important information about some of the ingredients of Flexadrin Cream™:

Inactive: All inactive ingredient added on the formulation of Flexadrin Cream™ are known to be well tolerated.

Taking/ Giving/ Using other medicines with Flexadrin Cream™:

Always tell your healthcare provider if you are using any other complementary or traditional medicine before giving you child Flexadrin Cream™.

4. HOW TO USE FLEXADRIN CREAM™

Do not share medicine with any other person.

- Apply Flexadrin Cream™ 3 – 4 times daily to the affected areas.
- Do not apply on broken skin.

Always take Flexadrin Cream™ exactly as per recommendation of the Package Insert or by your health care provider and if you are unsure.

In the event of over dose, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control center.

If you use more Flexadrin Cream™ than you should:

Do not use or apply more than recommended dose. (See Package Insert)

In the event of unpleasant reaction, developing skin rash, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider. If neither is available, contact the nearest hospital or poison center.

If you forget to take / missed a dose of Flexadrin Cream™:

Do not apply double dose to make up for forgotten individual doses.

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

There has not been cases of frequent or less frequent side effects reported when taking/using Flexadrin Cream™

- Only in cases of hypersensitivity reaction you may experience the following side effects: skin rash may occur.

However you should consult with your healthcare provider before taking or applying any herbal supplement ingredient.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet after taking Flexadrin Cream™, stop immediately the use of the product and consult your healthcare provider please inform your healthcare provider.

6. STORAGE CONDITION

Store all medicines out of reach of children.

Store in a cool, dry place below or at 25 °C.

Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light.

Do not store in a bathroom.

Do not use after expiry date stated on the label /carton and on the bottle.

Do not use Flexadrin Cream™ if you notice any visible signs of deterioration. Return all unused medicine to your pharmacist/ supplier.

Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems.

7. PRESENTATION OF FLEXADRIN CREAM™

White Cream packaged in 100 ml's poured in white tubes in an outer carton.

8. IDENTIFICATION OF FLEXADRIN CREAM™

White Cream.

9. REGISTRATION NUMBER

Date of Registration of Medicines:

[Will be allocated by MCC upon registration]

10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Kenza Health (Pty) Ltd, Suite 177, Private BagX7, Northriding, 2162

11. DATE OF PUBLICATON

April 2023

FLEXADRIN CREAM™

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE

BYLAE STATUS:

Geskeduleer 0

EIENDOM NAAM EN DOSISVORM:

Flexadrin Cream™

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur omdat dit belangrike inligting bevat

Flexadrin Cream™ is sonder doktersvoorskrif beskikbaar.

- Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
- Moet nie Flexadrin Cream™ deel met enige ander persoon nie.
- Vra jou dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer as jy meer inligting of advies nodig het.
- Jy moet 'n dokter sien as simptome vererger of nie na 10 dae verbeter nie.

1. FLEXADRIN CREAM™ BESTANDELE 100g:

Aqua(Water), Glycerine, Carbomer, Stearic Acid, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Cetareth 20, Dimethicone, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Methyl Salicylate 15%, Menthol 3%, Triethalonaminex

Inaktiewe: grapsaad, water aqua, gliserien, gliserielstearaat, menthe arvensis, nipaquad PDU, treitanolamien.

2. WAT FLEXADRIN CREAM™ IS GEBRUIK VIR:

Flexadrin Cream™ word aangedui as 'n vinnige waarnemende pynverligingsroom wat kan help om pyn te verlig en die mobiliteit van sagteweefselbeserings en gesamentlike buigsaamheid te verbeter. Dit kan die liggaam help om langtermyn slytasie op spiere en gewrigte te voorkom.

3. VOORDAT U FLEXADRIN CREAM™ GEBRUIK / GEBRUIK / GEEF:

Moenie Flexadrin Cream™ gebruik nie:

- As jy bekend is dat dit hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of enige van die bestanddele. (sien; SAMESTELLING)

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander medisyne gebruik. As u swanger is of borsvoed, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat u hierdie medisyne gebruik.

Swangerskap en borsvoeding:

Flexadrin Cream™ word nie aanbeveel vir swanger en lakterende moeders om hierdie medisyne te gebruik nie. Veiligheid en doeltreffendheid onder hierdie toestande is nie ondersoek nie.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van Flexadrin Cream™:

Onaktief: Al die onaktiewe bestanddeel wat op die formulering van Flexadrin™ Cream bygevoeg word, is goed geduld.

Neem / Gee / Gebruik ander medisyne met Flexadrin Cream™:

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander komplementêre of tradisionele medisyne gebruik voordat jy jou kind Flexadrin Cream™ gee.

4. HOE OM FLEXADRIN CREAM™ TE GEBRUIK

Moenie medisyne met enige ander persoon deel nie.

- Dien Flexadrin Cream™ 3 tot 4 keer per dag toe.
- Moet nie op gebroke vel toedien nie.

Neem altyd Flexadrin Cream™ presies soos op aanbeveling van die pakketinvoer of deur u gesondheidsorgverskaffer en as u onseker is.

In geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As jy meer Flexadrin Cream™ gebruik as wat jy moet:

Moenie meer as aanbevole dosis gebruik of toedien nie. (Sien pakketinvoegsel)

In die geval van onaangename reaksie, ontwikkel veluitslag, raadpleeg u dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer. As dit nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

As u vergeet om 'n dosis Flexadrin Cream™ te neem / gemis:

Moenie dubbeldosis toedien om vergete individuele dosisse te vergemaklik nie.

5. MOONTLIKE BIJWERKINGE

Daar was nie gevalle van gereelde of minder gereelde nowe-effekte wat gerapporteer is tydens die gebruik / gebruik van Flexadrin Cream™ nie

Slegs in gevalle van hipersensitiwiteitsreaksie kan u die volgende nowe-effekte ervaar:

- veluitslag kan voorkom.

U moet egter u gesondheidsorgverskaffer raadpleeg voordat u enige kruiemiddele-bestanddeel neem of toedien.

As u enige nowe-effekte sien wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, nadat u Flexadrin Cream™ geneem het, stop onmiddellik die gebruik van die produk en raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer asseblief u gesondheidsorgverskaffer.

6. STORAGE VOORWAARDE

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders.

Berg in 'n koel, droë plek onder of by 25 ° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in 'n buitenste karton.

Beskerm teen lig.

Moenie in 'n badkamer stoor nie.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie.

Moenie Flexadrin Cream™ gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie. Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels verkoop nie.

7. AANBIEDING VAN FLEXADRIN CREAM™

Witroom verpak in 100 ml wat in wit buise in 'n buitenste karton gegooi word.

8. IDENTIFIKASIE VAN FLEXADRIN CREAM™

Witroom.

9. REGISTRASIENOMMER

Datum van registrasie van medisyne:

[Sal deur MCC toegeken word by registrasie]

10. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER

Kenza Health (Edms) Bpk, Suite 177, Private BagX7, Northriding, 2162

11. DATUM VAN PUBLIKASIE

April 2023